



Para adultos con colangitis biliar primaria (CBP)

Deje que **LIVDELZI** se ocupe de su CBP *mientras usted vive el momento*

Representación de actores.

¿Qué es LIVDELZI?

LIVDELZI es un medicamento con receta que se usa para tratar la colangitis biliar primaria (CBP) en combinación con ácido ursodesoxicólico (ACUD) en adultos que no han respondido bien a ACUD, o que se usa solo en pacientes que no pueden tolerar ACUD.

No se recomienda el uso de LIVDELZI en personas con enfermedad hepática avanzada (cirrosis descompensada). Los síntomas de la enfermedad hepática avanzada pueden incluir confusión; tener líquido en el área del estómago (abdomen); heces negras, alquitranadas o sanguinolentas; tos o vómitos con sangre; o vómitos que parecen "posos de café".

Se desconoce si tomar LIVDELZI mejorará sus probabilidades de supervivencia o evitará la descompensación hepática.

Se desconoce si LIVDELZI es seguro y eficaz en los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVDELZI?

LIVDELZI puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Fracturas óseas.** Tomar LIVDELZI puede aumentar el riesgo de fracturas óseas. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier fractura ósea, o si desarrolla dolor o cambios en su capacidad para moverse.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

La CBP (siglas de “colangitis biliar primaria”) es una enfermedad autoinmunitaria rara del hígado



La CBP causa **inflamación** en las vías biliares del hígado.



Con el tiempo, **la formación de tejido cicatricial** causada por esta inflamación puede bloquear las vías biliares, lo que provoca daño hepático y reducción de la función hepática.



Si no se trata o no se trata lo suficientemente bien, la CBP puede provocar enfermedad hepática terminal y la necesidad de un **trasplante de hígado**.

¿Qué causa la CBP?

Se desconoce la causa exacta de la CBP y se cree que los factores genéticos y ambientales desempeñan una función en la enfermedad. Los investigadores han descartado el alcohol como una posible causa.

Medición de la progresión de la CBP

Su proveedor de atención médica puede monitorear algunas cosas para ver si su CBP está bajo control o avanza, lo que incluye:

ALP

Una enzima también conocida como **fosfatasa alcalina** (ALP, por sus siglas en inglés) o “**fosfato alcalino**”

Formación de cicatrices

Los FibroScan se utilizan para medir la cantidad de cicatrices en el hígado

La investigación ha demostrado que los niveles elevados de ALP están asociados con daño hepático que, en última instancia, puede requerir un trasplante de hígado

Síntomas de CBP

Cuando el hígado no funciona adecuadamente debido a la CBP, puede causar síntomas que tal vez no se dé cuenta de que se deben a una enfermedad hepática. Algunos de los síntomas más comunes de la CBP incluyen lo siguiente:



FATIGA



PICAZÓN EN LA PIEL

Hasta el 70 % de las personas con CBP experimentan picazón

Para algunas personas, la picazón incluso puede interrumpir el sueño, lo que puede provocar somnolencia y fatiga durante el día

Tratamiento de la CBP

Al tratar la CBP, su equipo de atención médica intentará mejorar los resultados clave de laboratorio de la enfermedad, incluida la ALP. Se ha demostrado que hacer que su ALP llegue a un nivel inferior reduce el riesgo de progresión de la CBP.

Objetivos del tratamiento de la CBP



Reducir su ALP



Reducir el riesgo de evolución de la enfermedad. La progresión de la enfermedad puede incluir lo siguiente:

- Cicatrización hepática (fibrosis)
- Daño hepático irreversible (cirrosis)
- Insuficiencia hepática y trasplante de hígado



Reducir los síntomas causados por la CBP



Primera línea de tratamiento de la CBP

El principal tratamiento actual para las personas que viven con CBP es el ursodiol (también conocido como urso o ACUD). **Ahora bien, alrededor del 40 % de las personas con CBP continúan teniendo niveles altos de ALP a pesar de tomar ursodiol.**

Expansión de las opciones de tratamiento

Por primera vez desde 2016, existen opciones de tratamiento adicionales disponibles para las personas con CBP.

Si aún tiene niveles elevados de ALP a pesar del tratamiento, hable con su equipo de atención médica; es posible que deba probar otro tratamiento para la CBP.


Cómo está diseñado el funcionamiento de LIVDELZI

LIVDELZI está diseñado para actuar de manera diferente a otros tratamientos para la CBP. Se dirige a un receptor celular específico en el hígado llamado PPAR-delta. Se sabe que la activación de PPAR-delta ayuda a reducir la producción de ácidos biliares

Además de ayudar a controlar la creación de ácidos biliares, se cree que la activación de PPAR-delta afecta partes de ciertas células hepáticas que participan en la inflamación y la formación de cicatrices en el hígado.

Sin embargo, no se comprende por completo cómo funciona LIVDELZI para tratar la CBP.

PPAR-delta = delta receptor activado por proliferadores de peroxisomas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVDELZI? (cont.)

LIVDELZI puede causar efectos secundarios graves, incluidos: (cont.)

- **Cambios en las pruebas hepáticas.** Se ha producido un aumento de las enzimas hepáticas en la sangre cuando se toma más LIVDELZI del que se recetó. Su proveedor de atención médica le realizará pruebas para controlar el hígado antes de que comience el tratamiento con LIVDELZI y durante este.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas de empeoramiento de problemas hepáticos durante el tratamiento con LIVDELZI:

- hinchazón del área del estómago (abdomen) debido a una acumulación de líquido
- coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos
- dolor en el lado derecho del estómago (abdomen)
- heces negras, alquitranadas o sanguinolentas
- toser o vomitar sangre, o el vómito se asemeja a "posos de café"
- cambios mentales como confusión, tener más sueño de lo habitual o mayor dificultad para despertar, arrastrar las palabras, cambios de humor o cambios en la personalidad

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

Permita que **LIVDELZI** ayude a mejorar los resultados clave de laboratorio de la CBP

LIVDELZI mejoró los resultados clave de análisis de laboratorio de la CBP

Una cantidad significativamente mayor de personas que tomaron LIVDELZI (62 %) vieron mejorar los 3 resultados de laboratorio clave de CBP en 1 año en comparación con las personas que tomaron placebo (20 %)



Alrededor de 6 de cada 10 personas

LIVDELZI se evaluó en un estudio clínico de 12 meses en 193 personas con CBP

- 128 personas tomaron LIVDELZI con o sin ursodiol
- 65 personas tomaron un placebo (un tratamiento que no contiene medicamento) con o sin ursodiol

Al comparar los resultados de las personas que tomaban LIVDELZI con las que tomaban placebo, el objetivo principal del ensayo clínico era comprobar si LIVDELZI ayudaba a las personas a mejorar 3 resultados de laboratorio clave:

- Niveles de ALP inferiores a 1.67 x el límite superior de lo normal (ULN)
- Una disminución en los niveles de ALP de al menos el 15 % desde el inicio del ensayo
- Niveles normales de bilirrubina

Otros objetivos del ensayo clínico fueron determinar si LIVDELZI podría ayudar en lo siguiente:

- Niveles de ALP más bajos durante 12 meses
- Alcanzar niveles normales de ALP (ALP menor o igual al ULN)
- Reducir la picazón en personas con puntajes de la Escala numérica de calificación (Numeric Rating Scale, NRS) de 4 o más puntos a los 6 meses

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.



Representación de actores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVDELZI? (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de LIVDELZI incluyen dolor de cabeza, dolor estomacal (abdominal), náuseas, hinchazón abdominal (distensión) y mareos.

Avísele a su proveedor de atención médica si tiene cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LIVDELZI.

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

Deje que **LIVDELZI**
ayude a reducir su ALP

LIVDELZI redujo los niveles de ALP a 1 mes y los mantuvo más bajos en la marca de 1 año



36 % en promedio

Reducción de la ALP a los 30 días
(frente al 5 % para el placebo)



Las personas que tomaron LIVDELZI experimentaron

un 42 % de reducción promedio de la ALP a 1 año
(frente al 4 % para el placebo)



1 de cada 4 personas (25 %) que tomaron LIVDELZI alcanzaron

niveles normales de ALP en 1 año
(frente a ninguna para el placebo)



Representación de actores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar LIVDELZI?

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene enfermedad hepática avanzada.
- cree que puede tener una obstrucción de las vías biliares en el hígado (obstrucción biliar).

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento
y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

Deje que **LIVDELZI**
ayude a mejorar su picazón

Mejoría de la picazón en un 1 mes, con una mejora significativa a los 6 meses: un hallazgo en la CBP

Las personas que comenzaron el ensayo con puntajes
de la NRS ≥ 4 vieron lo siguiente:



Rápida mejoría de la picazón

LIVDELZI
comenzó a mejorar la picazón
a los 30 días.



Significativa mejoría de la picazón

A los 6 meses, las personas que tomaron LIVDELZI
experimentaron una reducción promedio de la picazón con
respecto al inicio del ensayo de alrededor del 52 % frente al 26 %
para aquellos que toman placebo (disminución de 3.2 puntos en la
NRS frente a la disminución de 1.7 puntos para el placebo).

La NRS es una escala de 0 a 10 que mide la gravedad de la picazón, donde 0 es sin picazón y 10 es la peor picazón posible. Las personas evaluadas en el ensayo que ya tenían picazón comenzaron el ensayo con puntajes de la NRS de ≥ 4 ; el puntaje promedio de la NRS al inicio del ensayo fue de 6.1 para LIVDELZI (49 personas) y de 6.6 para el placebo (23 personas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar LIVDELZI? (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si: (cont.)

- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LIVDELZI puede dañar a un bebé en gestación.
- **Estudio de seguridad en el embarazo.** Si queda embarazada mientras toma LIVDELZI, informe de inmediato a su proveedor de atención médica. Existe un estudio de seguridad en el embarazo para mujeres que toman LIVDELZI durante el embarazo. Hable con su proveedor de atención médica acerca de proporcionar información al estudio de seguridad en el embarazo de LIVDELZI. El propósito de este estudio de seguridad en el embarazo es recopilar información sobre su salud y la salud de su bebé. Usted o su proveedor de atención médica pueden informar su embarazo llamando al 1-800-445-3235.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento
y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

LIVDELZI tiene un perfil de seguridad establecido

Los efectos secundarios más frecuentes en el ensayo clínico*

Efecto secundario	LIVDELZI (128 personas)	Placebo (65 personas)
Dolor de cabeza	8 % (10 personas)	3 % (2 personas)
Dolor de estómago	7 % (9 personas)	2 % (1 personas)
Náuseas	6 % (8 personas)	5 % (3 personas)
Hinchazón abdominal	6 % (8 personas)	3 % (2 personas)
Mareos	5 % (6 personas)	2 % (1 personas)

* Efectos secundarios informados en el 5 % o más de las personas en ensayos clínicos que tomaron LIVDELZI con o sin ursodiol, o bien placebo con o sin ursodiol.

Representación de actores.

Las personas que tomaron LIVDELZI tuvieron una menor interrupción (3.1 %) debido a efectos secundarios vs. placebo (4.6 %)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar LIVDELZI? (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si: (cont.)

- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LIVDELZI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si recibe LIVDELZI.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

Con la administración una vez al día, LIVDELZI puede adaptarse a su rutina



**Cápsula
una vez al día**



**Se puede tomar con
o sin alimentos**



**Se puede tomar en cualquier
momento del día**

Tome LIVDELZI exactamente como su proveedor de atención médica se lo indique

- Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a tomar LIVDELZI con ursodiol, solo, y/o con otros medicamentos que pueda estar tomando
- No tome más LIVDELZI de lo que le indique su proveedor de atención médica
- Si toma demasiado LIVDELZI, llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de emergencia de inmediato



Representación de actores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar LIVDELZI? (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los que se venden con receta y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. LIVDELZI puede afectar la forma en que actúan ciertos medicamentos. Ciertos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa LIVDELZI.

Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

Recursos financieros


Estamos aquí para ayudarlo

El **programa Gilead Support Path®** ofrece información y recursos para ayudar a las personas a las que se les receta LIVDELZI de modo que puedan comprender su cobertura y sus opciones financieras.


Una vez que le hayan recetado LIVDELZI, puede inscribirse en el programa en 4 pasos sencillos:



Complete el formulario de inscripción de Support Path



Un especialista del programa lo llamará para confirmar su inscripción en el programa



Comuníquese con un especialista del programa para averiguar si su tratamiento está cubierto por su plan de seguro médico



Un especialista del programa realizará una investigación de los beneficios e identificará posibles opciones de apoyo



\$0
COPAGO*

Puede pagar un **copago de tan solo \$0***
con el Programa de cupones de copago de LIVDELZI

* El apoyo con el cupón de copago está disponible únicamente para pacientes elegibles con seguro comercial. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Sujeto a cambios; para conocer los términos y condiciones completos, visite www.mysupportpath.com/co-pay. Esto no es seguro médico. Solo se acepta en las farmacias participantes.





Representación de actores.

Si necesita ayuda para pagar LIVDELZI, el Programa de cupones de copago de LIVDELZI puede ser de ayuda*



Para inscribirse en el **Programa de Support Path** o **preguntar sobre el Programa de cupones de copago de LIVDELZI**, puede conectarse en vivo con un especialista del programa Support Path al **1-855-7-MYPATH** (1-855-769-7284)

De lunes a viernes, de 9 AM, a 8 PM, hora del este

* El apoyo con el cupón de copago está disponible únicamente para pacientes elegibles con seguro comercial. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Sujeto a cambios; para conocer los términos y condiciones completos, visite www.mysupportpath.com/co-pay. Esto no es seguro médico. Solo se acepta en las farmacias participantes.



Escanee el código para obtener más información en LIVDELZI.com

 **Livdelzi**
seladelpar 10mg
Capsules

Para adultos con colangitis biliar primaria (CBP)

Deje que **LIVDELZI**
se ocupe de su CBP
mientras usted vive el momento

LIVDELZI es el único tratamiento para adultos con CBP que mejora significativamente los resultados clave de laboratorio de la CBP y la picazón

En el ensayo clínico, LIVDELZI:



Mejóro los resultados clave de análisis de laboratorio de la CBP

en una cantidad significativamente mayor de personas en comparación con el placebo en 1 año



Redujo la ALP a niveles normales

en 1 año, en una cantidad significativamente mayor de personas en comparación con el placebo



Redujo la picazón

a partir de 1 mes, con una mejoría significativa observada a los 6 meses

Diseño del ensayo

En un ensayo clínico de 193 personas con CBP, 128 personas tomaron LIVDELZI con o sin ácido ursodesoxicólico (ursodiol). Los resultados se compararon con 65 personas que tomaron placebo (un tratamiento que no contiene medicamento) con o sin ursodiol.

Datos del ensayo



Resultados de laboratorio de CBP: El objetivo principal del ensayo fue mejorar los resultados clave de laboratorio de la CBP al alcanzar niveles de ALP de menos de 1.67 veces el ULN, lograr disminuciones de la ALP de al menos el 15 % desde el inicio del ensayo y mantener niveles normales de bilirrubina en 1 año. El 62 % de las personas que tomaron LIVDELZI cumplieron con el objetivo principal del ensayo para el tratamiento de la CBP en comparación con el 20 % de las personas que tomaron placebo.



ALP: Un objetivo secundario del ensayo fue medir la normalización de la ALP a 1 año. LIVDELZI redujo la ALP a un valor normal en el 25 % de las personas en comparación con el 0 % de las personas que tomaron placebo.



Picazón: Otro objetivo secundario del ensayo fue medir la reducción de la picazón en personas con puntajes de la NRS de 4 o más a los 6 meses. La NRS es una escala de 0 a 10 que mide la gravedad de la picazón, donde 0 es sin picazón y 10 es la peor picazón posible. LIVDELZI redujo los puntajes de la NRS en un promedio de 3.2 frente a 1.7 para el placebo a los 6 meses.

Los efectos secundarios más frecuentes de LIVDELZI en el ensayo clínico incluyen dolor de cabeza, dolor estomacal (abdominal), náuseas, hinchazón abdominal (distensión) y mareos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVDELZI?

LIVDELZI puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Fracturas óseas.** Tomar LIVDELZI puede aumentar el riesgo de fracturas óseas. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier fractura ósea, o si desarrolla dolor o cambios en su capacidad para moverse.
- **Cambios en las pruebas hepáticas.** Se ha producido un aumento de las enzimas hepáticas en la sangre cuando se toma más LIVDELZI de que se recetó. Su proveedor de atención médica le realizará pruebas para controlar el hígado antes de que comience el tratamiento con LIVDELZI y durante este.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el documento y los [Datos importantes](#) sobre LIVDELZI en la última página.

Pregunte a su proveedor de atención médica sobre LIVDELZI



LIVDELZI, el logotipo de LIVDELZI, SUPPORT PATH, el logotipo de SUPPORT PATH, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc. o de sus compañías relacionadas.
© 2025 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-LIVC-0093 08/25



(liv del zi)

ACERCA DE LIVDELZI

LIVDELZI es un medicamento con receta que se usa para tratar la colangitis biliar primaria (CBP) en combinación con ácido ursodesoxicólico (ACUD) en adultos que no han respondido bien a ACUD, o que se usa solo en pacientes que no pueden tolerar este ácido.

No se recomienda el uso de LIVDELZI en personas con enfermedad hepática avanzada (cirrosis descompensada). Los síntomas de la enfermedad hepática avanzada pueden incluir confusión; tener líquido en el área del estómago (abdomen); heces negras, alquitranadas o sanguinolentas; tos o vómitos con sangre; o vómitos que parecen "posos de café".

Se desconoce si tomar LIVDELZI mejorará sus probabilidades de supervivencia o evitará la descompensación hepática.

Se desconoce si LIVDELZI es seguro y eficaz en los niños.

ANTES DE TOMAR LIVDELZI

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene enfermedad hepática avanzada.
- cree que puede tener una obstrucción de las vías biliares en el hígado (obstrucción biliar).
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LIVDELZI puede dañar a un bebé en gestación.
 - **Estudio de seguridad en el embarazo.** Si queda embarazada mientras toma LIVDELZI, informe de inmediato a su proveedor de atención médica. Existe un estudio de seguridad en el embarazo para mujeres que toman LIVDELZI durante el embarazo. Hable con su proveedor de atención médica acerca de proporcionar información al estudio de seguridad en el embarazo de LIVDELZI. El propósito de este estudio de seguridad en el embarazo es recopilar información sobre su salud y la salud de su bebé. Usted o su proveedor de atención médica pueden informar su embarazo llamando al 1-800-445-3235.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LIVDELZI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si recibe LIVDELZI.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los que se venden con receta y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. LIVDELZI puede afectar la forma en que actúan ciertos medicamentos. Ciertos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa LIVDELZI.

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre LIVDELZI y no sustituye hablar con su proveedor de atención médica sobre su afección y su tratamiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE LIVDELZI

LIVDELZI puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Fracturas óseas.** Tomar LIVDELZI puede aumentar el riesgo de fracturas óseas. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier fractura ósea, o si desarrolla dolor o cambios en su capacidad para moverse.
- **Cambios en las pruebas hepáticas.** Se ha producido un aumento de las enzimas hepáticas en la sangre cuando se toma más LIVDELZI de que se recetó. Su proveedor de atención médica le realizará pruebas para controlar el hígado antes de que comience el tratamiento con LIVDELZI y durante este.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas de empeoramiento de problemas hepáticos durante el tratamiento con LIVDELZI:

- hinchazón del área del estómago (abdomen) debido a una acumulación de líquido
- coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos
- dolor en el lado derecho del estómago (abdomen)
- heces negras, alquitranadas o sanguinolentas
- toser o vomitar sangre, o el vómito se asemeja a "posos de café"
- cambios mentales como confusión, tener más sueño de lo habitual o mayor dificultad para despertar, arrastrar las palabras, cambios de humor o cambios en la personalidad

Los efectos secundarios más frecuentes de LIVDELZI incluyen: dolor de cabeza, dolor estomacal (abdominal), náuseas, hinchazón abdominal (distensión) y mareos.

Avísele a su proveedor de atención médica si tiene cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LIVDELZI.

Llame a su médico para que lo asesore acerca de los efectos secundarios. Usted puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

CÓMO TOMAR LIVDELZI

Tome LIVDELZI por vía oral 1 vez todos los días con o sin alimentos.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de información importante sobre LIVDELZI. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Visite LIVDELZI.com o llame al 1-800-GILEAD-5.